

SHEMA VACCINAL 2016

AGE	tétanos	coqueluche	haemophilus	diphtérie	polio	hépatite B	méningite C	Rougeole oreillons	Inf. à pneumococque
2 mois	x	x	x	x	x	x			x
4 mois	x	x	x	x	x	x			x
9 mois								x à partir de 9 mois	
11 mois	x	x	x	x	x	x			x
12 mois							x		
16 à 18 mois								x	
6 ans	x	x		x	x				

Noms de spécialités :


- Hexavac, infanrix hexa : tétanos + coqueluche + polio + haemophilus + diphtérie + Hépatite B (BB)
- Pentavac, infanrix quinta : tétanos + coqueluche + polio + haemophilus + diphtérie (BB)
- Tetravac, infanrix tetra : tétanos + coqueluche + polio + diphtérie (6 ans)
- Repevax, boostrix tetra : tétanos + coqueluche + polio + diphtérie (réduit en Ag) (11 ans et 1 fois adulte, à 25 ans par exemple)
- Revaxis : tétanos + polio + diphtérie
- MMR VAX PRO, PRIORIX : rougeole + rubéole + oreillons (rattrapage vaccinal jusqu'à 31 ans)
- Prevenar 13 : infections à pneumocoque (BB)
- Neisvac : méningites du groupe C (rattrapage vaccinal jusqu'à 24 ans) - Méningitec ne se fait plus

Autres :

- Gardasil, cervarix : papillomatovirus (à partir de 9 ans)
- Rotarix : gastro à rotavirus (1° dose à 6 semaines ; 2° avant 24 semaines)
- Varivax : varicelle (à partir de 9 mois) (Si indication)
- Grippe saisonnière
- Hépatite A : actuellement recommandée pour les personnels s'occupant d'enfants avant l'âge de la propreté
- Méningite A, rage, leptospirose, fièvre jaune, typhoïde... etc

A St Just En Chaussée, le 20/09/2016

Le Président



Frans DESMEDT

Le Médecin



Dr Dominique RAUZIER